本草彙言

本草彙言卷之八

錢塘 倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏藏稿

沈公岐則施甫校正

木部 香木類

桂 味甘辛，氣熱，臭香，有毒。陽中之陽，浮也。入手太陽、太陰，足太陽、太陰、少陰經。

李蘋湖曰：桂有四等，曰牡桂、箘桂、桂心、桂枝之分，同是一種。牡桂，出合浦、交趾、廣州、象州、湘州、桂嶺諸處，生必高山之巔，旁無雜樹，自為林。葉色四時常青，凌冬不凋。如枇杷葉，邊有鋸齒，中心有縱文兩道，宛如圭形。四月放花，無實。木皮紫赤，堅厚，臭香，氣烈，味重者為最。枝皮為桂枝，幹皮之薄者為桂皮，厚者為肉桂，為桂心。○牡又箘桂出交趾、桂林山谷，生必臨嵓，正圓如竹，小于牡桂，亦自為林，凌冬不凋，葉如柿葉，尖狹光澤，邊無鋸齒。中心有縱文三道，三月結蕊，黃色，四月放花，五月結子，如閩河之實。木皮青黃，質軟而微易于環捲，如筒，亦以

皮之厚薄分桂心桂枝之差等也○桂海志云凡諸木類葉中心皆一道縱理獨桂葉有兩道三道如圭形故字從圭又埤雅云桂猶圭也宣道百藥爲之先聘通使如執圭之使也古名梫言能侵害他木故炮炙論云以桂木削釘釘樹根其樹即死是也○蘇氏曰本草載桂只有牡桂箘桂二種今嶺表所用則有箘桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別箘桂正圓如竹有二三重者則今之薗桂是也官桂皮薄色黃肉薄脂少即今之牡桂是也若平卷多脂即今之板桂是也若肉桂桂心皆從箘桂中分其肉厚其臭香其味辛甘其色紫者即肉桂也若肉桂又去外層留其中心一層者即桂心也如此分別則桂之名義可得而知矣又丹陽山有一種山桂葉如麻四月開細黃花木色亦紫氣微香只是一味苦辛與肉桂之香甘辛迥不同也市中僞充肉桂不可不辨

○桂枝散風寒逐表邪發邪汗止咳嗽去肢節間風痛之（張元素 朱丹溪）藥也（御醫門吉生甫）字韻云枝指也從木條而分支致四末也氣味雖不離乎辛熱但體屬枝條僅可發散皮毛肌腠之間遊

行臂膝肢節之處。故能散風寒。逐表邪。自內出外。辛以散之。甘以和之。熱以行之。又能入血分。利肝肺氣。止煩止咳。兼除風痺。肢節攣痛。專取其氣薄輕揚。上浮達表出汗。而通腠理也。仲景書。用以治冬月傷風寒。即病邪在表者。寇成兩氏論之詳矣。

○牡桂。治癰疽。排潰瘍。化膿血。(別錄)止疼痛。利筋骨血脈之裏。(王元)也。說韻云。(蕭天民類)牡。陽象也。有花無子。枝稍強也。故能行皮膚血肉之內。治癰疽已潰未潰。護心托裏。或筋骨疼痛。肌肉頑痲。或惡露不行。上攻心嘔。或跌撲損傷。瘀血積滯。此辛甘溫熱之用。善行血脈。以通筋骨。去陳以致新也。

〇肉桂去陰寒，止腹痛，通經脉，化冷痰，散奔豚，定寒疝，固泄瀉，止虛汗，暖腰膝，安蛔逆，治沉寒痼冷之藥也。此獨得純陽之力，以行辛散甘和熱火之勢。乃大溫中之劑。凡元虛不足而亡陽厥逆，或心腹腰痛而吐嘔泄瀉，或心腎久虛而痼冷怯寒，或奔豚寒疝而攻沖欲死，或胃寒蛔出而心膈滿脹，或血氣冷凝而經脉阻遏，假此味厚甘辛大熱，下行走裏之物，壯命門之陽，植心腎之氣，宣導百藥，無所畏避，使陽長則陰自消，而前諸證自退矣。如大氏方，又謂消瘀血，破痃癖者，亦取其辛烈陽健之氣，橫行直往，瘀血得熱則行，而痃癖僻居腸胃膜絡之間，自不容于不行矣。

繆仲淳先生曰。桂。其味辛甘。其氣熱烈。其性橫行直走。獨熱偏陽。表裏俱達。如和營衛。散表邪。出汗。實腠理。則桂枝爲長。故仲景專用。以治冬月傷風寒。即病邪在表者矣。更有桂心。與肉桂。實一物也。祇去皮耳。此則走裏行營。除寒。破血。平肝。入右腎命門。補相火不足。其功能也。然大忌于血崩。血淋。尿血。陰虛吐血。咯血。鼻衄。齒衄。汗血。小便因熱不利。大便因熱燥結。肺熱咳嗽。或產後去血過多。及產後血虛發熱。小產後血虛內熱。陰虛五心煩熱。陰虛小腹作疼。血熱經行先期。血虛內熱經閉。陰虛寒熱往來。血虛經行作痛。男婦陰虛。內熱外寒。口苦舌燥。或中暑昏暈。中熱腹痛。中暑瀉利暴注如湯。或

一切滯下純血。由于內藏伏熱。或腸風下血。臟毒便血。
酒後失血。或陽厥似陰。夢遺精滑。虛陽敗艱。脫陰目盲。
或一切溫病熱病。頭疼口渴。陽證發狂。陽毒發斑。或小
兒痧疹。腹疼作瀉。痘瘡血熱。乾枯黑陷。等三十餘證。法
並忌之。誤投則禍不旋踵。僅察病因用舍。在斷行其所
明。無行所疑。其難其慎。毋嘗試也。
前賢寇氏曰。桂。辛甘大熱。素問云。辛甘發散爲陽。故仲
景氏用桂枝湯治傷寒表虛。皆需此藥。正合辛甘發散
之意。本草三種之桂。不用菌桂牡桂者。此二種性止于
溫。不可以治風寒之病也。然農昱氏止言桂。仲景氏又
分桂枝者。特取枝上皮也。王氏曰。或問本草言桂能止

頻出汗而張仲景治傷寒有當發汗凡數處皆用桂枝湯又云無汗不得用桂枝汗家不得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用桂枝甘草湯此又用桂枝閉汗也一藥二用與本草之義相通否乎曰本草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脈止煩出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽必湊之故皆用桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗出而解非桂枝能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也昧者不知出汗閉汗

之意。一遇傷寒無汗者。便用桂枝。誤之甚矣。言桂枝發汗。發字當認作出字。風散營衛和。則汗自然出。非若麻黃大開腠理。發泄其汗也。其治虛汗亦當逆察其意可也。成氏曰。桂枝本為解肌者。太陽中風腠理緻密。營衛邪實。津液禁固。其脈浮緊發熱汗不出者。不可與此。必也。皮膚疏泄。自汗出。脈浮緩風。邪干於衛氣者。乃可投之發散。以辛甘為主。桂枝辛熱。故以為君。而以芍藥為臣。甘草為佐者。風淫所勝。平以辛。苦以甘緩之。以酸收之也。以薑棗為使者。辛甘能發散。而又用其行脾胃之津液而和營衛。不專于發散也。故麻黃湯不用薑棗。專于發汗不待行其津液而汗也

〇集方治傷寒太陽病頭痛發熱汗出惡風者用桂枝白芍藥生薑各二兩甘草一兩大棗十二枚水五升微火煎至二升徐徐服〇治傷風冷咳嗽用桂枝五錢防風半夏各三錢乾薑一錢北五味子北細辛各五分水煎服〇治四肢骨節間風痛用桂枝當歸白术防風羌活各二錢薑黃秦艽紅花川芎黃栢甘草各一錢水煎服

〇集方治癰疽發背膿水清稀膿毒不化疼痛不止用牡桂五錢白芷黃耆當歸皂角刺穿山甲人參各三錢羌活乳香沒藥金銀花各二錢水酒各半煎服〇治產後惡露不行上攻心嘔用牡桂五錢玄胡索醋炒五靈脂當歸紅花陳皮各二錢水煎服〇治跌撲損傷瘀血積

滯脹悶疼痛用牡桂三錢當歸川芎紅花蘇木桃仁乳香沒藥牛膝各二錢水煎服

○集方治三陰直中寒證頭不疼身不熱口不渴或有微熱微渴自汗腹痛泄瀉吐冷涎吐蛔蟲四肢厥冷躁煩不寐或語言錯雜時昏時省用肉桂附子童便製人參各三錢乾薑白朮炒黃耆炙吳茱萸各五錢北細辛一錢五分水煎服○治三陰寒疝攻沖欲死亦有厥逆自汗者用肉桂附子童便製小茴香青皮橘核厚樸陳皮炙吳茱萸各三錢水煎服○治奔豚疝瘕沖築用肉桂乾薑小茴香各五錢牡丹皮木香檳榔各二錢甘草五分水煎服○治婦人經脉冷凝阻遏不通腹痛脹悶用肉桂

木香各三錢陳皮玄胡索香附俱醋炒當歸川芎俱酒炒牡丹皮桃仁烏藥各二錢水煎服○治積年痃癖不消將發時止用肉桂木香白朮各一兩五錢當歸柎川芎香附小茴香俱酒炒佛手柑茯苓各三兩澤瀉山藥各二兩俱炒過研爲末煉蜜丸梧子大每早服五錢白湯下○治胎死不下用肉桂心研細末二錢芸硝一錢熱酒調服立下如難產及橫生者本方去芸硝加麝香二分溫酒調下○治大人小兒及老邁人食水菓乾菓等物傷脾腹脹用肉桂心研末米糊丸菉豆大每服五十丸酒下○治重舌鵝口用肉桂末薑汁調塗患處

木犀花味辛甘苦氣溫無毒

寇氏曰：木犀花生閩粤江浙山谷中，亦是筒桂之類，而性大異。其葉不似柿葉，有鋸齒如枇杷葉而粗澁者，有無鋸齒如梔子葉而光潔者，叢生巖嶺間，謂之巖桂。土人又呼為木犀。有三種之分，其花白者名銀桂，黃者名金桂，紅者名丹桂。有秋花者，有春花者，有四季花者，有逐月花者。其皮薄而不辣，白而不赤，淡而不香，不堪入藥。惟花香馥馨濃，可收曬乾作茗，或浸酒，或鹽漬，可作香茶香膠之類。

〇木犀花，散冷氣，消瘀血，止腸風血痢之藥也。其味苦，能下氣；其氣溫，能散寒；其臭香，能破結。凡患陰寒冷氣，瘕疝奔豚，腹內一切諸冷病，蒸熱布裹熨之，諸疾皆愈。

松脂味苦甘氣溫無毒

別錄曰松脂生太山山谷中原雖有不及邊塞與衡山者佳以通明如薰陸香成顆粒者為上樹僂子云凡松脂以老松皮內自然流出凝及流結根底不見日月者為第一入地深久化爲琥珀蘗以者次之炎成者亦不堪用五六月采雷氏曰修治須鎔化濾去松木及沙石水內令定而用麻布袋盛入沸湯煮一日取出布袋浮水面者用不出袋者不用 李氏曰松樹磥砢修聳多節其皮粗厚有鱗其葉二三月抽蕤有二針三針五針之別生花長三四寸采其花蕊為松黃結實狀如豬枝葉成鱗甲秋老則子長甲裂隨風飛散着土便生惟遼海及雲南者子大如巴豆可食謂之海松子詳見果部

○松脂拔毒瀉癰收膿去腐肉之藥也其氣溫燥其質粘泥子外科作散子敷塗或和油煉成膏子貼蓋一切潰爛敗穢腐肉能排膿血為必用之物故前古主癰疽惡瘡白禿癧瘍疥瘙風氣不過外應敷貼功盡之矣有言

煉久色白如玉，服食能潤心肺，輕身延年。此荒唐不稽之說，不可信從。如入瘍科，敷貼料中，可去膿長肉。腐蝕初作，或初潰者可用。如久潰瘍膿血已盡，氣虛血衰，肉泛而不斂者，用此不惟不能生新肌，反增潰爛，延流皮肉，損人筋脉，不可勝言。用者當細審之。

○集方　治癰疽惡瘡，及背發一切腫毒，以成膿潰未破出頭者。用煉過松脂四兩，香油一兩，鎔化，用銅綠五錢，研細末，和入，用黃油紙攤貼瘡上，膿血盡出，俟膿將淨，然後以丹粉膏貼之。○治癰疽腫毒，潰破膿水淋漓，膿頭不出。用煉過松脂一兩，滴明乳香、真沒藥俱放瓦上焙出油，各五錢，樟腦一錢，共爲細末，摻入瘡內，收膿甚效。

〇治小兒白禿瘡。（聖惠方）用煉過松脂、黄丹、各五錢、輕粉三錢。共爲細末。菜油調搽。先用米泔湯。洗淨。搽藥。一日一次。

〇治瘰癧瘡瘍。（鬼遺方）用煉過松脂、五錢、大黄、蓽茇、各一兩、樟腦、檳榔、各五錢。共爲極細末。用猪脂油、一兩。和研爲丸加水銀、八錢。再研。以水銀散。不見點爲度。須過搽瘰癧癬。以藥丸瘡上摩之。一二次愈。

〇治蟲蛀牙痛。（摘玄方）用煉過松脂、一兩。菜油、三錢。火上熬化。將冷凝。加入蝦蟆酥末、五分。用筯攪勻。取米粒大。內入牙痛隙處。即止。

〇治鼠瘻數眼穿破。（聖惠方）內潰不收。用煉過松脂、一兩。菜油、三錢。火熬化。加飛過黄丹、五錢。用筯攪勻。取膏子撚成細條子。內入孔中。膿水拔出。漸乾收口。用人參、黄耆、白朮、當歸、

各三錢。水煎服。卽止劑。
○續補方○治風蟲牙痛。用松脂一塊。滾湯泡化。一漱卽
止。○治一切瘻瘡。用松脂研末。填孔令滿。日三四度。○
治小兒頭上軟癤頻發不愈。俗名軟癤頭。用煉過松脂
八兩。銅綠二兩。麻油三兩。猪膽汁三箇。先將松脂火上
鎔化。乃下油并膽汁。熬勻。傾入水內。扯拔百遍。貯磁器
內。遇此患。每用細布攤貼。不須再換。○治精入白帶。久
不愈。用煉過松脂五兩。酒二升。煮乾。入木臼內杵細爲
丸梧子大。每服百丸。溫酒下。○治一切腫毒。用煉過松
香八兩。銅青二錢。蓖麻子仁五兩。同搗成膏。攤貼。未成
卽消。已成卽潰。甚妙。○治一切膿爛瘡疥。用煉過松香。

四兩，葱頭二兩，入臼內搗爛，加入生猪脂三兩，再搗成膏，用油單紙攤，夾紙貼，每日翻換，以米泔溫洗，半月愈。

松實味甘，氣溫，性和，無毒。

方氏曰：松實出松卵鱗甲中，見前松脂條內，又云見果部中。

○松實補精髓血氣之藥也。陳氏方主風痺寒氣，虛羸少氣，諸不足。謹經云：精不足者，補之以味，甘能益血是已；形不足者，溫之以氣，溫能和氣是已。服餌却疾延年，除五勞七傷，惟此足以當之，然亦久服乃可責其效耳。

○集方：治風痺寒氣，虛羸少氣，及五藏勞傷，咳嗽吐痰，骨蒸盜汗，心神恍惚，飲食不甘，遺精滑泄等證。用松實仁八兩，麥門冬不去心一斤，金櫻子、枸杞子各八兩，熬膏。

少加煉蜜收，每早晚白湯調服十餘茶匙。

松節味苦，氣溫，無毒。

方氏用松節，用大松樹山斵取以赤黑油如蠟者佳。

○松節去骨節中風濕之藥也。別錄方主一切風虛風氣，骨痺疼麻，脚膝疼痛，宜釀酒飲之。此係松樹之骨也，質堅氣勁，久亦不朽，故去筋骨間風濕諸病。但氣溫性燥，如足膝筋骨有風有濕，作疼作痠，痿弱無力者，用此立痊。倘情慾斷喪之人，陰虛髓乏，血燥有火者，宜斟酌用之。

○集方　治脚弱（千金方）骨節風，以松節釀酒飲。○治遍身筋骨內（外臺秘要）痛，用松節打碎，如豆大，炒焦，釀酒飲。○治歷節（同前）風痛，四

肢如解脫。以松節十觔。酒三斗。浸三七日。每服一合。日五六服。○治跌撲損傷。用松節煎酒飲。

松葉味苦。氣溫。無毒。

方氏曰、松葉又名松毛。叢針上生、形如鬃鬣、有二鬣、三鬣、五鬣之異。

松毛、去風濕、療癬癩惡疾之藥也。大氏方云、松毛性燥質利、炒黑善去風濕頑癬、濕爛浸漬不乾。并敷冬月凍瘡。生取搗爛作丸、能治大風癩疾、或歷節風痛、或脚氣痿痺、或頭風頭痛、并諸證。已上數病、凡關風濕致患者、相宜。倘因血虛風燥致病者、禁用之。

○集方、治風濕頑癬、用松毛炒黑一兩、和輕粉、樟腦、各三錢。濕則乾摻、燥則用油調搽。如瘡極者、以米醋調敷。并

治凍瘡，如濕爛者，乾腫者，作癢者，悉依頑癬同法。○治大風癩瘡，用松毛取生新者搗爛，焙燥，每用松毛二兩，枸杞子二兩，浸酒飲，時時服，不得大醉，久服效，并治歷節風痛，腳弱痿痺。（局方）○治頭風頭痛，用生鮮松毛四兩，搗爛焙燥，浸酒，時時飲之，其滓取出，貼頂門，用布裹頭二日乃愈。（方脈正宗）

松花味甘，氣溫，無毒。

方氏曰：松花，即松黃，拂取之，似蒲黃，功用勝如脂、仁及葉也。

○松花輕清涼滑，療久痢，解酒毒，清血熱之藥也。（李時珍本草）土人及時拂取，和白米炙實，白糖調勻，印為糕餅，作茶飯食之，大能養胃，清燥熱。遼東風俗以此款賓，歷載聞所時尚。（王昕源）

也。

○集方治瘡癬[illegible]瘡爛破損血出。或皮裂癢流。用松花摻之即乾。○治久痢（方脉正宗）不止。延及數月。緩弱。宜用松花。每服三錢。食前米湯調下。○治好飲之人。濕毒發作。頭痛目眩。或咽喉閉悶。或下利清水。日數十行。形神萎頓。（庸工悞作陰寒自利。妄用溫燥熱藥者。多有之。）用松花一兩。焙。陳皮五錢。川黃連三錢。甘草二錢。俱微炒。磨為末。與松花和勻。每早晚各服二錢。白湯調服。二日即愈。

治吐血胸中氣塞。吐出血紫黑色成塊者。是瘀血也。用松花茜草根桃仁大黃枳殼各一錢○治吐血遇勞即作者是勞傷動血也。用松花人參白朮白芍藥麥門冬生地黃各一錢○治衄血不止。出於脾也。用松花茜草根黑山梔黃芩枯梗甘草玄參生地黃桑皮各一錢稱一兩○治咳血不止出於肺也用松花川貝母生地黃桑皮欵冬花天麥二冬各一錢五分甘草一錢○治咯血不止出于腎也。咯出血屑用松花生熟二地天麥二冬阿膠各二錢紫苑知母黃柏各一錢○治嗽血不止出于胃也。鮮血隨嗽而出者用松花茜草根茯苓川貝母天麥二冬杜仲生地黃柏係各二錢甘草七分炮薑灰八分。○治溺血不止心移熱于小腸也。用松花生地黃黃芩黃柏黑山梔知母木通甘草天門冬川黃連萹蓄茯苓蓮心各二錢○治便血不止大腸出血係府蘊積濕熱也。用松花茜草根側柏葉炒。槐角地榆阿膠當歸生地各二錢黃柏白芍藥蒼朮黑山梔川芎各一錢此方不問糞前糞後。并腸風下血並皆治之。

栢子仁。味甘。氣平。無毒。入足厥陰。少陰。又入手少陰經。

陶隱居曰。栢處處有之。當以太山。陝州。宜州。乾陵者爲良。四時長青。葉皆側生。枝皆西向。有四種。一曰叢栢。葉叢聚。今人呼爲千頭栢。一曰渾栢。獨葉叢莢。木心紫赤。一曰刺栢。枝皆有刺。嫩之戟手。皆不結實。惟其作香。不入藥用。一曰扁栢。木心微白。芳香清烈。作花細小。結實有角。角四裂出子。霜後采取。中仁黃白色。最多脂液。惟乾陵者。木理旋繞。有異氣。山水鳥獸狀。

修治。蒸熟去皮殼。搗作餅子。曰乾收用。

(○)栢子仁。潤燥。補髓。養心神。定驚悸之藥也。（李東璧）此藥氣極芬芳。（[illegible]）則脾胃所喜。質極潤澤。則肝腎所宜。故前古謂安養五藏。主驚悸。定心神。悅顏色。聰耳目。爲延年卻病之上劑也。但體質多油。腸滑作瀉者勿服。膈間多痰者勿服。陽道妄舉。腎家有熱者勿服。已油者能令人嘔。勿入藥用。

李瀕湖先生曰：按六書精蘊云：萬木皆向陽，而栢獨西指，蓋陰木而有貞德者，不畏霜雪，得木之正氣也。又埤雅云：栢之指西，猶鍼之指南也。

○集方：治心神虛怯，腎髓衰乏，驚悸怔忡，志意恍惚，或睡臥不寧，或虛煩懊憹等證。用栢子仁二兩，研，入參、茯苓、當歸、川芎、半夏、遠志、棗仁、白朮俱炒，各一兩二錢，川黃連酒炒五錢，共爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早晚各服三錢，白湯下。○治小兒躽啼驚癇，腹滿，大便如青苔色。用栢子仁研末，白湯調服一錢。○治黃水濕瘡。用眞栢油二兩，熬稠，搽之立愈。

側栢葉：味苦澁，氣微寒，無毒。

雷氏曰：栢葉有花栢葉、叢栢葉及有子圓葉。其有子圓葉成片，如大片雲母，葉皆側形，葉上有微赤毛者，宜入藥用。如采葉，須隨四時爲方：春採東，夏採南，秋採西，冬採北，取其得月令之氣也。

○側栢葉。止流血，去風濕之藥也。凡吐血、衄血、崩血、淋血、血熱流溢于外絡者，搗汁服之立止。凡歷節風痛，遍身走注，痛極不能轉動者，煑汁飲之即定。惟熱傷血分與風濕傷筋脉者，兩病專司其用。但性味苦寒多燥。如血病係熱極妄行者可用，如陰虛肺燥、因咳動血者勿用也。如痺病係風濕閉滯者可用，如肝腎兩虧、血枯髓敗者勿用也。司業者當熟籌之。

盧子由先生曰：扁栢芳香高潔，文彩陸離，即參天直上，誰能禁之？乃俛焉西向，以順受金制，可謂至德也已。

檗喬木作社稷棟梁宜哉殷人以栢其遂知後世之西向乎。

○集方治吐血衄血不止或血崩血淋諸血熱證用新鮮側栢葉五錢白芍藥懷生地眞阿膠各三錢甘草八分水煎服。○治歷節風痛痛如虎咬走注遍身不能轉動動即痛極晝夜不寧用側栢葉五錢水酒當歸紅花羌活防風各二錢水煎服

○續集方治小兒泻痢用側栢葉炒黃煎湯代茶○治蠱痢下血黑色或茶脚色或膿血如淤色用側栢葉川黃連俱微炒各等分共爲末每服一錢苓心白湯調下。治腸風亦効○治酒毒下血或下痢用嫩側栢葉九蒸九

晒二兩陳槐花炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每茶心白湯下百丸○治中風不省人事得病之日便進此藥（[illegible]氏方）可使風退氣和不成廢人用側柏葉一握去枝葱白一握連根研如泥無灰酒一升煎一二十沸服如不飲酒人分作四五服服完方進他藥

胡桐淚味鹹苦氣大寒無毒氣味俱厚陰中之陰也入足陽明經

蘇氏曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今涼州亦有之其樹高大皮葉似白楊桐桑輩故名木堪作器用其脂液下地與土石間木相雜狀如黃礬而堅實得水即消繁若礬石消石之類冬月採之

○胡桐淚降火熱清痰結之藥也經曰熱淫于內治以鹹

寒。如急患火熱火毒，咽喉口齒腫脹不通，或心腹煩滿而脹者。用此鹹能潤下，苦能湧上，或下而愈，或吐而瘥，取效甚捷。滑氏方又治熱極急黃，黑汗、黃汗，諸證皆資其鹹苦而寒，能除極熱之病耳。然性善湧泄，如胃家虛寒不食者，勿用。

○[illegible]方治咽喉急脹腫結不通。（[illegible]方）用胡桐淚三錢，硼砂二錢，生礬一錢，膽星一錢五分，共為末，用一二茶匙，薑湯調嚥，漸消而通。

○治人患急黃，或黑汗、黃汗。（千金方）用胡桐淚三錢，白湯調服。

○治牛馬病急黃，黑汗、黃汗。（聖惠方）用胡桐淚一二兩，研細末，水調灌之，立愈。

杉木味辛苦氣溫無毒可升可降陽也入足陽明經

蘇氏曰杉木生江南深山中木類松而徑直葉硬扁細刺附枝生緣實如楓實江南人以驚蟄前後分枝插種出蜀黔及諸峒所産者更良其木有赤白二種赤杉實而多油白杉虛而潔燥有斑紋如雉尾者作棺尤貴不生白蟻郭氏云眞杉木可以爲船爲棺及作屋柱埋入土中不易朽蝕燒炭拌研黃作火藥甚速

○杉木去惡氣消脹氣下腳氣之藥也別錄方煮湯外洗治風濕毒瘡腫滿邪氣又大氏方煎汁內服治奔豚上氣心腹沖脹等疾以辛溫直達開發升散之性若毒瘡若腳氣若腫滿若奔豚四者皆屬五氣壅逆不升不降之故此藥氣味芬芳能下逆氣散毒邪有開達內出之功大能發揚火鬱疏申肝令獨擅其長者矣奈世人舍近求遠深可慨也

前賢柳氏云某得脚氣夜半痞絶脇有塊大如石困不知人搐搦上視三日榮陽鄭公用杉木節橘樹葉各三兩大腹子七枚俱切碎童子小便三大碗水一碗共煮至碗半徐徐灌之少頃大下三行卽氣通塊散人事復甦

○集方治平人無故腹脹卒然成蠱此時行惡毒之氣也用眞杉木片四兩和眞紫蘇葉三兩煎湯飲之○治脚氣腫滿用眞杉木片二兩牛膝木瓜檳榔各一兩煮湯淋洗三四次愈○治遍身風濕毒瘡或癢或痛或乾或濕用眞杉木片八兩煎湯浸洗自消○治奔豚疝瘕沖築脹悶疼痛用眞杉木片二兩吳茱萸青皮小茴香橘

核各八錢，乾薑五錢，服汁飲。○治轉筋霍亂，脚氣，用眞杉木片二兩，香薷、木瓜各一兩，煎湯溫飲。○治臁瘡，照爛，用多年老杉木節燒灰，研末，麻油調，隔油單紙攤貼，紮定，數換即愈。○治小兒陰腫赤痛，日夜啼哭，用眞杉木燒灰三錢，入鉛粉一錢，清油調搽，即安。（衛氏方）

樟木　味辛，氣溫，無毒。

李氏曰：樟木，西南處處山谷有之。其木理細而錯縱有紋，故名樟。木高丈餘，葉小似楠而尖長，背有黃赤茸毛，四時不凋，夏開細花，結小子。木大者數抱，宜于雕刻器物。○樟有大小二種，紫淡二色，外有釣樟，即樟之小者。二樟一類二種，生植七年乃可分別。

○樟木，辟邪氣，解中惡，定霍亂之藥也。（陳藏器）此物辛香竄烈，能發胃中停痰宿食，吞吐酸水，伏飲積滯等證。又煎湯浴

脚氣洗疥癩能祛風逐濕滯而善升能達木鬱之病如胃虛中氣弱者禁用。

○集方治霍亂（陳氏方）及乾霍亂不吐者以樟木屑三五合煎濃汁飲之即吐甚良（醫學正傳）又中惡鬼氣卒死者以樟木屑燒烟薰之即甦○治手足痛風痛如虎咬用樟木屑數升煎湯乘熱用布蘸湯熨洗安手足于湯上薰之或坐湯桶上以草薦圍住蒸之其効甚速

○釣樟又名烏樟即樟木之小者氣味功用與樟木主治同惟治金瘡出血不止刮末敷之甚驗又特異于樟木也

辛夷味辛，氣溫，無毒。氣味俱薄，浮而散，陽也。入手太陰、足陽明經。

別錄曰：辛夷生漢中、魏興、梁州山谷，今江浙處處有之。人家園圃中多種植。樹高二三丈，枝條繁茂，極剛又脆。二三月開花，花出枝頭，有紫白二色。花落方生葉，葉間蕾含花出，經夏秋，歷冬，其苞漸大，長半寸而尖銳。苞外有苞，重重有青黃茸毛順鋪，苞形如小毛桃。開花時脫苞，花似蓮花，大如茶盞，如蘭花香。白者呼為玉蘭，紫者呼為紫蘭。更有千瓣者，以紫花之蕚為貴。年淺者有花無子，經三十年方結實也。修治：用粗布拭淨蕚上毛，以淨水浸半日，焙乾用。

〇辛夷，溫肺氣，通鼻竅之藥也。（別錄）故諸走三陽，除風寒風濕于頭面耳鼻齒牙諸分。（李國祿）若頭眩昏冒，兀兀如欲嘔；若面腫面癢，隱隱如蟲行；若耳閉耳鳴，或癢或痛；若鼻淵鼻塞，或脹或瘡；若齒痛齒腫，或牙齦浮爛等證，咸宜用之。

此藥辛溫上達。能解肌散表。芳香清潔。能上竄頭目。逐陽分之風邪。疏內發之寒鬱。則諸證自愈矣。前古謂通九竅利五藏。通關脉。退寒熱。意在斯乎。但辛香浮竄氣虛之人。雖偶感風寒。致諸竅不通者。不宜用。頭腦痛屬血虛火熾者。不宜用。齒牙痛與耳病屬肝火胃火者。不宜用。

李士林先生曰。肺開竅于鼻。而胃脉環鼻上行。凡中氣不足。清陽不升。則頭痛而九竅不利。辛夷稟春陽之氣味薄而散。能助胃中清氣。上達高巔。故頭面九竅皆歸于治乎也。

○集方治頭眩（外科）昏冒欲嘔。此屬寒痰也。用辛夷一兩。製半

夏膽星天麻乾薑川芎各八錢為末水發為丸每晚服三錢白湯下○治頭面腫癢如蟲行此屬風痰也用辛夷一兩白附子半夏天花粉白芷殭蠶玄參赤芍各五錢薄荷八錢分作十劑服○治耳閉不通或虛鳴如雨響或耳內作癢作痛用辛夷黃芩柴胡川芎半夏甘草各五錢為末每晚服三錢白湯調下如腎虛亦有耳閉耳鳴作癢作痛者川辛夷二兩配入六味地黃丸料中每服五錢臨睡白湯送下○治鼻淵鼻塞用辛夷甘草各一兩蒼耳子八兩甘菊花二兩俱炒江魚齒一兩五錢膠泥裹火內燒紅去泥俱為細末每晚服三錢白湯調下○治鼻內作脹或生瘡此係酒毒者多用辛夷一

兩。川黃連五錢。連翹三兩。俱微炒。研爲末。每飯後服三錢。白湯下。○治齒牙作痛。或腫。或牙齦浮爛。用辛夷一兩。蛇床子二兩。青鹽五錢。共爲末搽之。

沉香味辛，氣溫，臭香，無毒。氣厚味薄，可升可降，陽也。入足陽明、太陰、少陰，兼入手少陰、足厥陰經。明辨味香補直，惟係辛辣者性熱。

蘇氏曰：沉香生天竺諸國及海南海北、占城、真臘、黎峒等處。寇氏曰：嶺南諸處悉有，傍海處尤多。奇然連枝岡嶺相接，木理虛柔，凌冬不凋。小者拱抱，大者數圍。體如白楊，葉如橘柚，花如穀穗，實如小檳，皮膜可作紙。未經斧斤者，雖百歲之木，亦不孕香。若半老之木，其斜枝曲幹，斫鑿成坎，雨露浸漬，斯膏脈凝聚，漸積成香。李氏曰：凡三等。其一即斫鑿之坎，氣聚色變，木端棕透，切而取之，入水輕浮者，為黃熟。其二，津沫營注，木理堅實，剝而取之，入水或浮或半浮者，為棧香。棧香，速香也。其三，精液所鍾，蘊結成塊，或自脫，或解取，入水沉底者，為沉香。品亦凡四：曰熟結，曰生結，曰脫落，曰蟲漏。蟲漏者，因蠹嘗而結也；脫落者，因水朽而結也；生結者，因斫鑿而結也；熟結者，因自腐而結也。俊熟結一名死結，死結則全體膏脈凝聚成香，此等之至上品之至貴者也。前四結總謂一木有狀，其多凡四十有二，如角沉、革沉、黃沉、烏沉、水盤、承露、青桂、黃蠟、繭栗、蓬菌、靈芝、金絲、葉子、麻葉

竹箭機棧附子馬蹄牛頭燕口蝟刺龍鱗烏刺虎壓雞骨蓬萊虎斑弄水鷓鴣斑仙人女及為杵為臼為肘為拳為山石為樓閣為鳳雀龜蛇雲氣人物種種肖象既所稟不侔亦復優劣有與各俟其形全氣足而後采取功力始備今嶺南人不耐其成每多趨利伐賊之害惟瓊管黎人非時不妄剪鑿故變獲與香雖纖薄如紙入水亦沉萬安黎母山東峒者更冠絕天下一片嘗值萬錢以東峒日鍾朝陽之氣其香更幽醞于他產耳若瓊上來者臭多辛烈尾烟必焦交趾海北者更甚故南人不甚重之北皆沉香等品奇狀也盧氏曰又奇南香原屬沉香同類附樹分牝牡則陰陽形質臭味情性各各差別其成沉之本為牝為陰故味甘厚性溫利臭含藏然之臭頗勝陰體而陽用藏精而起亟也成奇南之本為牡為陽故味辛辣臭烈發性禁止繁之間二偏陽體而陰用備外而為固也至若等分黃機品成四結狀肖四十有二則一矣莉牝多牡少獨奇南世稱至貴即黃棧二等亦得四之以論高下沉本黃熟圓坎端棕透淺而材白臭亦易散奇本黃熟不惟棕透而黃質遂與猶如熟色遠勝生香蠟系結價南鸗鵝難過也棧即奇南液重者曰金絲其熟結生結蟲漏鹿茫四品雖死稱奇南結而四品之中又各分別油結糖結蜜結綠結金絲絲為熟為生為濡為漬亦然成段耳大都沉香所重在

質，故通體作香，入水便沉。奇南雖結同四品，不惟味極辛辣，著舌便木。顛四結之中，每必抱木，曰油，曰糖，曰蜜，曰綠，曰金絲。色相生成，亦迥別也。雷氏曰，凡使沉香，須要不枯，如觜角硬重，沉沒水下者為上，用紙裹懷中，候燥乳研易干成粉。

○沉香，降氣溫中之藥也。陳承氏 此劑得雨露清陽之氣最久。其味辛，其氣溫。其性堅結，木體而金質者也。善治一切衝逆不順之氣。上而至天，肺 下而及泉，腎 使上氣壅者，可降。下氣逆者，可和。與諸藥為配，最相宜也。滑氏本草，治上熱下寒，上盛下虛，或濁氣不降，清氣不升，為病逆氣喘急，或大腸虛閉，小便不通，或男子精冷，婦人血冷，大能調中，利五藏，壯元陽，補腎命。方書廣用有効。然氣味辛溫香竄，治諸冷氣逆氣，氣鬱氣結，殊為專功。如中氣

虛勞氣不歸元者。心鬱不舒由于火邪者。命門眞火衰。由于精耗血竭者。俱忌用之。前古謂能殺鬼邪。解中惡。清人神。消風水毒腫。並宜酒煮服之。此不過因其辛陽香散。辟此陰氛不正之氣故也。如病陰虛氣逆上者。尼切

○集方 方脉正宗 治壅氣衝逆不能下降。爲脹滿。爲喘促。爲心胃不通。或痛。或痞者。用沉香。磨汁數分。以杏仁、大腹皮、茯苓、廣陳皮、川貝母、各一錢五分。半夏一錢。甘草五分。水煎。和沉香汁服。內熱者。加川黃連、枯黃芩、各一錢。內寒者。加乾薑、木香、砂仁、各一錢。方氏切要 ○治下氣虛而上逆者。加人參、白朮、各一錢五分。○治肺氣壅逆不下。用沉香。磨汁數分。以杏仁、桔梗、桑白皮、廣陳皮、白前、茯苓、各一錢。水煎。

和沉香汁服。○治陰虛腎氣不歸原用沉香磨汁數分以麥門冬懷熟地各三錢茯苓山藥山茱萸肉各二錢牡丹皮澤瀉廣陳皮各一錢水煎和沉香汁服。○治上熱下寒有二法。一法用沉香磨汁一錢以半夏薑製二錢五分附子童便製三錢白朮炒肉桂各二錢水煎和沉香汁頓冷服此引陽下降則寒自去。一法用沉香磨汁一錢以半夏薑製一錢五分川黃連枯黃芩天花粉連翹石膏各三錢水煎和沉香汁趁熱服此瀉陽下泄使陰氣上升陰陽和而上不熱下不寒矣。○治上盛下虛亦有二法。一法用沉香磨汁一錢以蘇子杏仁廣陳皮桑白皮厚樸枳殼車前木通茯苓各二錢水煎和沉

香汁服，降其上盛之氣，則下虛自愈。一法：用沉香磨末一兩，以人參、鹿茸、補骨脂、懷熟地、枸杞子、山茱萸、虎脛骨、川萆薢、川石斛、牛膝、山藥、肉桂、當歸、小茴香，俱鹽酒洗炒，各二兩，研爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早服五錢，白湯下。峻補其下，則上盛自平，下虛自愈。○治濁氣不降，（方脉正宗）清氣不升，用沉香磨汁一錢，木香、茯苓、車前子、厚樸、防風、升麻、真蘇子、杏仁、橘皮、陳皮、白前、白芥子各一錢五分。水煎，和沉香汁服。○治大（同前）腸氣滯，虛閉不行，用沉香磨汁八分，以當歸、枳殼、杏仁泥、肉蓯蓉各三錢，紫菀一兩，水煎，和沉香汁服。○治膀（林人和手集）胱氣滯，虛澁，小水不通，用沉香磨汁一錢，以茯苓、車前子、牛膝、燈心、甘草、瞿麥、麥門

冬地骨皮各二錢木香八分水煎和沉香汁服○治男子精寒不嗣孕婦人血冷不育川沉香磨末一兩鹿茸一對黃耆白朮枸杞子懷熟地山茱萸覆盆子補骨脂北五味子九製何首烏當歸川芎俱酒洗炒各四兩磨為末以黑豆濃汁煮紫河車二具搗爛成膏為丸如黍米大每早服五錢酒下○治心神不足火不降水不升（王璆百一選方）健忘驚悸用沉香人參各五錢茯神二兩共為末煉蜜丸如梧桐子大每早晚各服百丸白湯下○治轉胞不通非小腸膀胱厥陰受病乃強忍房事或過忍小便所致當治其氣則愈非利藥可通也用沉香木香各二錢為末空心用白湯調服○治腎家（王仲陽家抄）虛冷目暗不明宜暖

水藏。用沉香一兩，真川椒去子炒出汗四兩，共為末，酒糊丸，梧子大，每服六十丸，空心淡鹽湯下。○治胃冷作（活人心統）呃。用沉香、真紫蘇葉、白豆蔻仁各一錢，共為末，每服七分，柿蒂湯調服。

奇南香，味辛辣，氣溫，無毒。其生成出處，主治功用，與沉香同，但性氣較沉香稍潤緩耳。氣惟含攝，能縮一便。今講官人值經筵，常佩此香，以免泄氣。

丁香。味辛甘苦，氣熱，無毒，純陽，氣厚味薄。入手太陰、足少陰、陽明經。

蘇氏曰：按廣志云，丁香出東海及崑崙國，今交廣南番亦有。其樹高丈餘，凌冬不凋，木類桂，又似栗，葉似㮈，花似梅，花色黃緗，實如山茱萸，色紫黑，形兩合可分，剖開如雞舌，故又名雞舌香。八月采。又云臘冬生花，至次年方采實。又一說是草類蔓生，今乳香中揀出一種如棗核堅硬者之無味，燒亦不香，乃番棗子核也。

〇丁香，煖胃溫脾，回陽逐冷之藥也。故方氏方主除嘔吐，止泄瀉，理腹痛，去呃忒，散奔豚，逐疝氣，辟鬼疰，截瘧痢，煖腰膝，壯元陽，乃溫中建陽之品。凡諸陰寒水冷之邪為患，咸需用之。又按開寶方治齒疳䘌䘌，口臭胡氣，及痘瘡寒陷，灰白不發諸證，亦取此辛溫純陽雄烈之力，而香竄又能走毒，解除穢濁，發新陽故也。如以上諸證

須真虛寒者。方可投入。如兼內熱有火證者。槩勿施用。若陳氏方。治痘瘡濕爛不起發。或腹脹泄瀉。四肢冷逆表裏俱虛寒之象。並用木香散。異攻散。倍加丁香、肉桂亦有愈者。即有此證。然必運氣在寒水司天之際。又值嚴冬極冷之時。用此大辛熱之藥發之可也。若不識時辨證。一槩用此。不惟不能生全。反遭流謗。愼之愼之。九方 集方 方龍潭本草切要

○集方。治胃寒嘔吐。用母丁香三錢。白朮、製半夏、廣陳皮、白茯苓各二錢。俱炒黃。研末。每服二錢。白湯下。○治脾胃虛寒。作泄瀉。用母丁香五錢。廣陳皮、白茯苓、藿香、枳紫厚朴、訶子肉各三錢。俱炒過。研爲末。每早服二錢。米湯下。○治陰寒腹痛。兼四肢厥逆。自汗自利者。用母丁

香三錢人參黃耆白朮肉桂木香各二錢甘草一錢俱微炒研爲末作散服白湯調下數錢或水煎服亦可○治陰寒呃忒用母丁香二錢爲末柿蒂十箇煎湯調服○治奔豚或疝氣疼痛用母丁香一錢五分吳萸乾薑炙甘草各一錢青皮七分花椒一錢二分水煎服○治鬼疰身似痛非痛似癢非癢似寒非寒似熱非熱似睡非睡似醒非醒形神默默語言懶出病名鬼疰此心胃有伏痰所致用母丁香一錢膽星製半夏白茯苓各二錢共爲末每早晚各服一錢燈心湯下○治虛瘧久不止寒多不渴者用母丁香一錢爲末於白朮炒當歸身柴胡牛膝乾薑各二錢水煎服○治久痢胃寒脾冷虛

滑不止。用母丁香、茯苓、於白朮、訶子肉、白扁豆俱炒燥、爲末。每早服二錢。米湯調下。○治腰膝寒冷。并痿弱無力者。用母丁香五錢。金毛狗脊、於白朮、黃耆、當歸身、牛膝、枸杞子、川萆薢、木瓜、大茴香各二兩。俱酒洗炒。研爲末。懷熟地四兩。酒浸蒸。搗膏。共爲丸。梧桐子大。每早晚各服三錢。白湯下。

○續集方。治胃冷嘔逆。氣厥不通（十便良方）。用母丁香三枚。陳皮二錢。水煎熱服。○治齒牙疳臭或黑蝕（[illegible]）。用母丁香煮汁。含之。○治小兒冷疳（衛生易簡方）。面黃腹大。食即吐者。用母丁香七枚爲末。乳汁和。飯鍋上蒸三次。每用薑湯調服五分。○治（[illegible]）食蟹傷脾腹痛或作瀉。用母丁香一錢爲末。薑湯調服

○治食魚腥生冷瓜果致傷用母丁香二錢陳皮一錢共為末每服八分薑湯調服○治婦人陰冷（本草衍義）用母丁香三顆為末紗囊盛納入陰中自煖○治男生瘜肉（聖惠方）用母丁香綿裹納之○治腋下胡臭（[illegible]）用母丁香末不時搽之久用漸除

丁香枝皮味氣與香同攻一切冷氣為病如心腹脹滿惡心嘔吐泄瀉虛滑水穀不消諸證並宜水煮服之

治疝氣一切諸證。多因熱鬱于中。寒束于外而成。用厂查五分。木香、砂仁、茴香、香附、玄胡索、當歸、蒼朮、黑山梔、川烏、各一錢。水煎冷服。如挾外邪。發熱惡寒、頭痛者本方加紫蘇、前胡。如大便久閉結不通者。加酒製大黃脹悶者。加枳實、厚朴。有瘀血者。加桃仁、紅花。腎氣沫上氣閉欲絕者。加沉香、枳實、四肢厥逆。自汗脉沉者。加製附子、人參、當歸（）大凡疝氣一病。有六種。腸中走氣作聲茲痛肯疑盤腸氣也、加青皮、陰囊手按作響聲痛者。是膀胱氣也。加澤瀉、臍旁一梗升上釣痛者。是小腸氣也。加藁本、小瘦下注上奔心腹急痛者。是腎氣逆也。加吳茱萸、陰子偏大者。是偏墜也。加荔枝核、火燒酒淬。陰子翦破大而不痛者。是木腎氣也。服前方加灸。一切疝氣發于暑月者。多兼暑氣入膀胱也。加香薷、滑石、一切疝氣年久不愈者。前方宜加蒼朮歸地。治陰囊皮漏出水。外用丁香、川楝子、各等分。爲極細末摻之。

檀香味辛苦氣溫無毒陽中微陰入手太陰足少陰陽明經

李氏曰按大明一統志云檀香出占城眞臘爪哇渤泥暹羅三佛齊回回等國今廣東雲南及嶺南諸地亦有之樹如荔枝皮青色滑澤又香譜云皮實而色黃者爲黃檀皮潔而色白者爲白檀皮腐而色紫黑者爲紫檀其木俱堅重清香而白檀尤良宜以紙封固則不泄氣又格古論云紫檀諸溪峒出性堅新者色紅舊者色紫有蟹爪紋俱可作帶圍扇骨等物匀檀多與然藝非上品沉水者不得入藥

○白檀香辟惡氣散結氣除冷氣伏妖邪鬼氣之藥也辛香開發能升生胃氣元素方通噎膈進飲食除心腹冷痛散陰寒霍亂諸證入調氣藥中引芳香之物上至極高之分胸膈之上咽嗌之間爲理氣之妙劑也但辛香芳烈而竄如陰虛火盛有動血致嗽者勿用之

〇集方，治噎膈，飲食不入，用白檀香一錢五分，茯苓、橘紅各二錢，俱爲極細末，人參湯調下。〇治心腹冷痛，用白檀香三錢，爲極細末，乾薑五錢，泡湯調下。〇治陰寒霍亂，用白檀香、藿香、梗木香、肉桂各一錢五分，爲極細末，每用一錢，炒薑五錢，泡湯調下。〇治男婦爲妖鬼所憑，如癡如醉，人事昏迷，以檀香末臥牀前燒薰，則邪魅自退。

〇紫檀味苦鹹，氣寒，無毒。

紫檀散風毒，活瘀血之藥也。陶氏方刮末傅金瘡，止血定痛；又醋磨汁，傅一切卒腫，因血滯所傷者，立驗。李瀕湖先生曰：白檀辛溫，氣分之藥也，故能理衛氣而調脾肺，利胸膈，除寒霍亂；紫檀鹹寒，血分之藥也，故能和營氣而消腫毒，治金瘡，止血定痛。

降眞香味辛甘氣溫無毒

李氏珣曰降眞香出黔南山谷中及大秦國似蘇方木燒之不甚香得諸香和之則特美入藥以番降紫而潤者爲良李瀕湖曰今廣東廣西雲南安南漢中施州永順保靖及占城暹羅渤泥琉球諸番皆有之又溪蠻志云降眞香本出海南今溪峒僻處所出者似是而非勁瘦如雞骨不甚香又眞臘志云降眞香生深林番人頗費砍伐之力乃樹心也其外有白皮厚五六寸焚之氣勁而遠又草木狀云降眞香長莖細葉根極堅實重重有皮花白子黑其莖斜枝疊相宿中經火成紫香可降神按此數說前後似同而稍異或中國者與番外來者有不同乎

○降眞香辟邪氣活瘀血之藥也李氏方療折傷活血止痛治金瘡止血生肌內服外敷俱有驗也又治天時疫癘瘟瘴災疾并一切妖神怪異宅舍中焚燒盡皆屏跡

○集方治折跌并金瘡血出不止或潰爛不收用眞降香

以鋒刀刮下細末敷之縛定。內服數錢。乳香湯調服甚効。○治上部有傷瘀血停積按之胸膈作痛此吐血候也。急以降眞香鋒刀刮末。白湯調服。立時消散。凡怒氣傷肝。致吐血不止。用此功過鬱金。

楠木。味辛。氣溫。無毒。

李氏曰。楠木生南方。而黔滇蜀廣諸山尤多。其樹直上。枝葉叠叠。若幢盖之狀。茂似梔。而大如牛耳。經歲不凋。新陳相換。其花赤黃色。實似丁香。色青味甚苦。偉高者十餘丈。巨者數十圍。氣甚芬芳。爲船爲梁棟。爲器具皆佳。色赤者堅。白者稍脆。居水久則中空。爲蟻所穴。其近根年深向陽者。結成花草山水之狀。俗呼爲骰栢楠。可作器。

○楠木。利水下氣之藥也。別錄方。治時行暑濕所傷。霍亂吐下。煎汁服之。又轉筋脚氣腫痛不遠。煎湯淋洗。凡數木皮枝葉根。四件主治同功。

烏藥味辛苦，氣溫，無毒。可升可降。氣厚于味，陽也。入足陽明、少陰經。

陳氏曰：烏藥生嶺南邕州、客州及江南。蘇氏曰：今台州、衡州、雷州亦有之。俗以天台者爲勝，又不及海南者堅實而力大。其木似樟而矮，根葉亦以樟氣，高八九尺臾，禁山中極多。土人以爲薪。一葉三椏，葉尖而微圓，面青背白，狀類鄉餅。四五月開花，細碎淡黃灰白色。六七月結子，似冬青子，生青熟紫，核殼浮薄，仁苦而微香。根不其大，形如芍藥，嫩者肉白，老者色黑，稍中心有車轂紋，形如連珠者佳。八月采根用。

○烏藥，調氣和血之藥也。辛溫香竄，能散諸氣。故方氏方主風氣用身頭麻搔癢，或風寒濕熱四氣所侵，或身重體疼，寒熱交作，或風濕流注，腫毒破潰，或鬱結脹滿，表裏壅塞，或胎前產後，血氣不和，或血閉不行，癥瘕積聚，用此大溫之劑，自能行氣中之血，則諸證自除也。局方

治中風宗氣用烏藥順氣散以此則氣順而風散也濟

生方治七情鬱結上氣喘急用四磨湯以此降中兼升

瀉中兼補也補陰丸以此下通少陰腎經上通脾胃元

氣故丹溪方中往往用之又凌氏方謂此藥治一切氣

除一切寒消一切食調一切血婦人溫經非此不行小

兒諸蟲非此不去大人諸痛非此不除宜白

湯磨汁服之更勝于水煎服也但辛香溫燥散氣頗捷

凡屬氣虛內熱者忌之

繆仲醇先生曰世人多以烏藥香附同用治女人一切

氣病不知氣有虛有實有寒有熱冷氣暴氣用之固宜

如氣虛氣熱用之能無貽悞耶以故婦人月事先期小

便短赤。及咳嗽內熱。口乾舌苦。不得眠。一切陰虛內熱之病皆不宜服。

已下九方出瀕湖本草要

○集方治風痰風氣不拘遍身上下頭面四肢等處頑痺麻木。用烏藥二兩。木香五錢。防風白术秦艽天麻當歸川芎枸杞黃栢黃耆白芥子各一兩。俱用酒洗炒研爲末。煉蜜丸梧子大。每早晚各服三錢。白湯下。○治中風中濕遍身作疼。時發寒熱。用烏藥防風葳蕤羌活各三錢。水煎服。○治風濕流注遍身生毒。上下腫潰。用烏藥二兩。香附白术川芎木瓜牛膝當歸黃耆各三錢。水煎服。如陽衰胃弱。血氣虛冷者。本方可加人參附子。童便製各一錢。○治七情鬱結。胸膈脹滿。表裏邪鬱。用烏藥

川芎、香附、俱酒炒、各三錢、枳殼、厚樸、半夏、陳皮、茯苓、各二錢、水煎服。○治胎前產後、血氣不和、腹脹腹痛、用烏藥、香附、當歸、川芎、俱酒炒、各三錢、水煎服。○治婦人女子、無故血閉不行、肚腹脹悶、或成癥瘕血塊、用烏藥、香附、三稜、莪朮、玄胡索、炙甘草、廣陳皮、各五錢、俱酒洗炒、研爲末、每早服三錢、白湯調下。○治中風中氣、用烏藥一兩、白朮八錢、白芷、陳皮、川芎、麻黃、乾薑、桔梗、枳殼、殭蠶、甘草、各一錢、俱炒燥、研爲末、每服一錢、白湯調下。名烏藥順氣散○治七情鬱結、上氣喘急、用烏藥、沉香、檳榔、人參、各磨濃汁、共七分、徐徐嚥之。名四磨湯○治陰虛氣滯、肝胃不調。此藥上達胃脾、下通腎經、用烏藥、北五味子、各二

兩枸杞子、杜仲、牛膝、當歸、白芍藥、懷熟地、黃栢、知母、山茱萸肉各二兩俱用鹽酒拌炒研爲末煉蜜丸梧桐子大每早服五錢白湯下。名補陰丸

衛生家寶

續補集方、治一切氣痛不拘男婦冷氣血氣肥氣痞氣息賁氣伏梁氣奔豚氣胃痛氣及腳氣疝氣一切搶心刺痛冷汗喘急欲絕用天台烏藥小茴香青皮良薑各四兩俱酒拌炒研爲末每遇此急用白湯調服一錢。

斗門方

烏藥子、治陰毒傷寒腹痛欲死取一合炒至黑烟起投水中煎十餘沸服一大盞汗出止陽回即瘥。

治婦人經水將來作痛者或作作乍止血滯氣滯也用（同前煎）烏藥當歸川芎白芍藥川黃連香附桃仁去皮各一錢五分紅花玄胡索牡丹皮莪朮各一錢俱用酒拌炒過水二碗煎一碗食前服十帖全愈○治婦人經水行（同前）久不止者將成血崩也用烏藥當歸川芎白芍藥生地黃白朮黃芩黑山梔地榆黑荊芥香附人參白茯苓各一錢五分甘草五分俱用醋拌炒過水二碗煎八分食前服十劑愈○治婦人經水久不行發腫者血瘀滲入（同前）脾經用烏藥當歸川芎白芍藥桃仁去皮紅花牡丹皮乾薑肉桂乾漆枳殼白朮香附牛膝玄胡索各一錢五分俱用酒拌炒過水二碗煎八分食前服五劑愈

楓香脂 又名白膠香 味辛苦。氣平。無毒。氣薄味厚。陽中之陰也。入足厥陰經。

蘇氏曰。楓樹。西南方。及關陝甚多。樹高大。枝榦修聳。大者連抱數圍。其木甚堅。有赤有白。葉圓而作岐。有三角。三月開花。白色。乃連着實。大如鴨卵。有柔刺。八九月熟。將暴乾。其取脂。爲楓香脂。五月斫爲坎。烈日灼之。流漿而成。十一月采。又解字云。楓木。葉厚枝弱。善搖漢宮殿中多植之。至霜後葉紅可愛。故稱楓宸。又臨川記云。嶺南楓樹。歲久生瘤。遇雷雨漸長。至三五尺。謂之楓人。雕刻鬼神。可極靈異。修治。凡用香脂。入滚水內煮百沸。再入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。近世人不識此。惧以松脂明瑩者其謬

○楓香脂。摻一切癰毒。排膿止痛。活血生肌之藥也。李時珍 其性疏通。故木易爲蚛穴。入外科方。爲癰疽要藥。又治吐血衄血不止。又治齒腫。齒痛。齒脹不消。究其味苦。能涼血熱。辛平能完毒。瘡粘膩。能去風燥。爲散。爲膏。爲丸。外敷

內服隨證制宜可也

○集方治一切惡毒潰瘍并破爛不收諸瘡先以米泔溫水洗淨用楓香脂眞鉛粉各等分爲細末摻之○治便癰膿血不乾用楓香脂一兩配輕粉二錢麝香一分共研細末摻之○治瘰癧軟癤用楓香脂一兩溶化以蓖麻子肉六十四粒研入待成膏攤貼○治諸瘡不合口用楓香脂眞輕粉各二錢用豬脂和塗○治金瘡斷筋用楓香脂爲末敷之○治吐血衄血不止用楓香脂蛤粉各等分爲細末共和勻每服一錢柿餅煎湯調下○治齒疾證腫痛或服或蛀年久不愈用楓香脂六錢香蘊內細灰四錢共研細末每早晚以指頭蘸藥揩擦○治大風癩瘡用楓香木皮燒存性和輕粉各等分爲細末麻油調搽效○治水瀉水痢用楓香木皮煎飲立止

熏陸乳香。味辛苦。氣溫。無毒。氣厚味薄。陽也。入足太陰手少陰。兼入足厥陰經。

陳承氏曰。熏陸香。西出天竺國。色黃白。南出波斯國。色紫赤。生沙磧中。樹類古松。葉似棠梨。盛夏脂溢皮外。將皮甲剝取。爲熏陸。脂流之處。垂滴成乳頭者。爲乳香。所鑿脂溢成塊者。爲陳香。流溢自上而下。用錦接取者。爲餅香。淋瀝根底。雜砂石者。爲砂。黯色黑者。爲土。塌受水浸色敗。氣變者。爲水濕。塌所謂雜屑者。爲雜末。播揚如塵者。爲粉。纏末。總是熏陸一種。分析也。得原采垂滴乳頭。圓明潤澤者。爲眞。如脂溢重疊。纍纍然不成乳頭者亦即揀香也。修治。用酒浸。研如泥。如作末。用糯米數粒或燈心草數莖。或人指甲二三片。共研之。即細如粉。

○乳香。活血去風。舒筋止痛之藥也。陳氏發明云。香烈走竄。故入瘍科。方用極多。又跌撲鬭打。折傷筋骨。又產後血氣攻刺。心腹疼痛。恒用此。咸取其香辛走散。散血排膿。通氣化滯。爲專功也。故癰瘍可理。折傷可續。產後瘀

血留滯。前行瘀塊痞積、伏血冷瘕可去矣。但性燥氣烈。去風活血。追毒定痛。除癰瘍產後。及折傷筋骨之外。皆不須用。

○劉默齋集要方云。內托護心散。以乳香徹瘡孔中。能使毒氣外出。不內攻也。又凡病筋不伸者。敷藥嘗加乳香。極能伸筋。又婦人難產。服湯丸散中。嘗用乳香。使胎滑易生。又治諸經卒痛。及心腹久疼。用乳香、酒煎服。立時安定。又與諸香同用。能驅邪辟惡。與歸芎同用。能調血催生。並羌獨秦防。散風濕。于血滯。並芎朮芷草。排膿潰以生肌。凡屬血風寒濕。痺痛諸疾。不可缺此。

○集方。治跌撲或鬬打。折傷筋骨。用眞乳香、眞沒藥、各一

錢五分。當歸尾、紅花、桃仁、各三錢。水煎服。○治跌打潰爛疼痛。用乳香、三錢。麻油熬化。冷凝。早晚搽瘡上。○治難產催生。（回生方）用乳香、沒藥、各三錢。俱瓦上焙出油。冬葵子、三錢。共爲末。白湯調服。即產。○治產後瘀滯不清。攻刺（李念莪手集）心腹作痛。用乳香、沒藥、俱瓦上焙出油。各三錢。五靈脂延胡索、牡丹皮、桂枝、各五錢。俱炒黃。黑豆、一兩。炒成烟炭。共爲末。每服三錢。生薑泡湯調下。○治癰疽腫毒。（外科全書）未成可消。已成排膿定痛。用乳香、沒藥、白芷、連翹、赤芍藥、當歸尾、皂角刺、俱炒。穿山甲、火燒焦。各一錢二分。金銀花、二錢。酒水各一碗。煎八分服。○治一切癥瘕痞積。伏（奇完天傳）血冷瘕。用乳香、沒藥、俱瓦上焙出油。各五錢。草烏、一錢

酒洗炒黃、三稜莪朮各一兩酒炒，於白朮六兩五錢炒。共爲末，阿魏五錢酒頓化，和爲細丸，如黍米大，每早服二錢酒下。○治心胃痛，用乳香、沒藥各一兩，俱瓦上焙出油，拌水研爲細末，玄胡索、木香、白牽牛各五錢，俱焙燥，共爲細末，與乳沒和勻，每服二錢，白湯調下。○治中風口眼喎斜，用乳香燒烟熏之，以順其血脉。○治小兒急慢驚風，用乳香瓦上焙出油，甘遂微炒，各五錢，共爲極細末，每用五分，薄荷湯調服。○治小兒內釣腹痛，用乳香、沒藥俱瓦上焙出油，木香各八分，爲細末，用五分，白湯調服。○治風齲牙痛，用乳香安孔中，燒銀簪頭烙化即止。○治諸般漏瘡，膿血不止，用乳香、沒藥各五錢，瓦上焙出油，牡蠣燒炭三錢，共爲末，黃蠟五錢，香油五錢，共熬勻和丸，如黍米大，每服一錢，白湯下。

没藥味苦辛，氣溫，無毒。氣薄味厚，陰也，降也。入足厥陰經。

馬氏曰：没藥生波斯國。蘇氏曰：今海南諸國及廣州亦有之。其木之根株，俱似橄欖，葉青而密，歲久者則有脂液流滴下地，凝結成塊，色黑，微香，狀似安息香，或大或小，斷碎光瑩可愛，采無時。○或云，采時掘樹下為坎，用斧伐其皮，脂流于坎，一月方取。如入藥修治，與乳香同。

○没藥破血行瘀，化積聚，止腹痛之藥也。李杉抄 凡金刃木石，或跌撲鬬打，墮壓等傷，瘀血內攻，筋骨疼痛，並宜研細，熱酒調服數錢，能推陳致新，活死血，和新血也。如產後惡血宿垢不行，變態諸患，咸宜服之。此藥大槩其功長于通滯血。血滯則氣亦壅，血滯氣壅，則經絡滿急，經絡滿急，故發腫作痛也。如金刃傷，木石傷，鬬打墮壓傷，產後血結傷，癰瘍瘀痛傷，咸需之耳。江鶴陶林 然乳香活血，没藥

行血散血皆能止痛消腫故二藥每相兼用。
繆仲醇先生曰、沒藥善通壅滯之血治一切傷損腹中血結作痛要藥而不主諸虛也。凡骨節間與夫胸腹脇肋背胛腰脊之痛非屬瘀血停留而因于血虛者胎前血虛血熱腹中痛者產後惡露去多腹中虛痛者癰疽潰久膿水淸稀者皆不宜用。

○集方主治諸證與乳香同

麒麟竭。味鹹甘。氣平。無毒。氣薄味厚。陰也降也。入足厥陰手少陰經。

蘇氏曰。麒麟竭。生西胡。大食諸國。今廣州亦有之。樹名渴留。高數丈。似沒藥樹。婆娑可愛。葉似櫻桃葉。有三角色黃赤。樹中有脂液流出如膠飴狀。久而堅凝成塊。色赤如血者。故名。以火燒之。赤汁湧出。成灰不變本色者。爲眞。一說。敲斷而有鏡面。光彩能映人影。或取磨指甲弦間。紅透甲者方妙。外有一種海母血。眞相似。只是味鹹氣腥。麒麟竭。味鹹微甘。臭似梔子氣。爲別也。雷氏曰修治另研作粉篩過。入丸散中。若同衆藥搗。則化作塵飛散也。

○麒麟竭活血。瘀散血。聚破血。結行血。死之藥也。凡跌撲鬪打。及墮壓損傷之輕者。曰血瘀。曰血聚。傷之重者。曰血結。曰血死。皆血脈留滯于腹中。及經絡骨節之處。與肌肉俱腐敗者。非活血行血之藥。不能治。然欲保其

生全。含乳沒麒麟竭之類，誰能起其危困乎。倘有斷骨
損筋，或傷及藏府，血瘀血脹，垂死者。此三種之外，更加
山羊血，或猴經，二三錢，酒調灌之，下咽即有生理，真活
命之良方也。又療癰疽惡毒，引膿生肌。
○前賢劉河間曰：血竭除血痛，爲和血之聖藥，乳香、沒藥
雖主血病，而兼入氣分，此藥專于血分者也。
○集方 治一切打撲損傷。用麒麟竭、乳香、沒藥二味瓦上
烙出油，自然銅火煅酒淬，狗頭骨火煅，酒淬，麻皮灰，黃
荆子，骨碎補，各等分，俱酒炒，共爲末。每服三錢，白湯下。
○治產後血暈，不知人事，及狂言者，用麒麟竭一兩，研
末。每服二錢，溫酒下。○治產後血衝心膈，脇滿，命在須
臾，用麒麟竭、沒藥各一錢五分，研細末，煎童便和酒調服。
○治一切金瘡及臃毒潰爛，不生肌肉，用麒麟竭、研髮
灰、乳香、沒藥、輕粉、象牙末各等分，冰片些少，共爲末，摻
之。○治金瘡出血不止，用麒麟竭爲末，敷之。○右五方
出醫林集要。

安息香。味辛苦。氣平。無毒。氣厚味薄。陽也。入手少陰經。

蘇氏曰。安息香生西戎。及南海波斯國。今安南三佛齊諸番亦有之。樹如苦楝。長二三丈。大而且直。皮色黃黑。葉似羊桃而長。有四角。經寒不凋。三月開花黃色。花心微碧。不結實。刻其木皮。其脂如飴。又如松脂黃黑色。能發衆香。故人取以和香。絕焦。然不宜于燒也。

○安息香。通心竅。辟鬼邪。除中惡魘寐之藥也。大氏方祛一切神鬼。魍魎。妖魅。精邪。及人身寒濕冷氣。霍亂陰病。又治婦人產後血暈。血脹。口噤。與疾。并老人氣閉。痰厥失音等疾。蓋此藥入手少陰心經。心藏神。病由氣閉痰厥。則神昏矣。神昏。則邪惡鬼氣易于侵犯。藉此芳香清烈之氣。通神明而開心竅。辟諸邪。則前證自除也。但辛香行散之品。亦能走散真氣。如中氣不足。陽神自虛。非

關惡氣鬼邪侵犯者。宜斟酌用。

○集方。治鬼疰。（已下四方出方脉正宗）尸疰。寐魘。暴亡。及大人小兒卒中惡氣。一切神鬼精邪侵犯者。用安息香一錢。鬼臼二錢。犀角八分。牛黃五分。丹砂、乳香、雄黃各一錢二分。俱研極細末。石菖蒲、生薑各一錢。泡湯。調服五分。○治寒濕冷氣。中霍亂陰證者。用安息香一錢。為末。人參、製附子各二錢煎湯調服。○治婦人產後血暈、血脹、口噤垂死者。用安息香一錢。五靈脂水飛淨末五錢。共和勻。每服一錢。炒薑湯調下。○治老人氣閉痰厥。失音垂死。用蘇合香丸薑湯調服。立甦。此方推安息香為首用也。

蘇合香味甘氣溫無毒

蘇氏曰蘇合香出西域及崑崙紫赤色與紫檀相似堅實體重如石極芳香燒之灰白者佳又一說云廣州亦有蘇合香但類蘇木無香氣煎汁如膏油者極芳烈而香色黑狀如獅子矢也又梁書云中天竺國出蘇合香是諸香汁煎成非自然一物也又一說云蘇合香出安南三佛齊諸番國樹生膏脂以濃而無滓者爲佳又一說云蘇合香多葉子如金色核之即沒放之即起良久不定如蟲動氣烈者佳又一說此香出蘇合國因以名之然諸說聚訟不一朱不敢執是執非但采集以俟後之博物君子鑒定云

○蘇合香通五臟六府一切氣殺去風行痰除癇定悸鎮驚安神之藥也香烈氣竄能溫散留滯故局方主辟惡鬼精邪蠱毒瘴氣中風中寒及溫瘧寒熱夢魘魂迷尸蟲尸疰并心腹卒痛吐利時氣一切暴疾或牙關緊急人事不清服此使閉悶者疎通昏眩者省覺故命名曰

蘇合云。

○集方治五藏六府氣逆不通用蘇合香一錢石菖蒲焙三錢薑製半夏焙三錢共爲末以蘇合香酒溶化爲丸如龍眼核大每服一二丸淡薑湯化下。○治五種癇證用蘇合香一錢五分薑製半夏焙膽製南星焙天竺黃各三錢共爲末以蘇合香酒和化爲丸龍眼核大每早晚各食前服二錢淡薑湯下○治驚悸神志不寧用蘇合香一錢二分羚羊角犀角俱鎊末各三錢茯神天竺黃膽星俱微炒各五錢共爲末以蘇合香酒溶化爲丸龍眼核大每早晚各服一丸燈心湯化下。○治惡鬼精邪作祟用蘇合香于臥牀前焜之或川芎當歸湯調服

○治溫瘧寒熱，從山林草野瘴癘之間，或從囹圄瘟瘧之氣而成者。用蘇合香一錢，紫蘇葉五錢，川芎三錢，廣陳皮二錢，共爲末。每服五分，淡薑湯調下。○治心膽之氣虛，多患夢魘魂迷之證。用蘇合香二分，人參五分，生薑一錢。每臨臥時泡湯飲之。○治尸蟲傳染，并尸疰鬼疾。用蘇合香、安息香、乳香、沉香各五分，泡湯一碗，空腹飲之。此藥可泡十餘次，以藥盡爲度。○治心腹卒痛，吐利時氣。用蘇合香五分，藿香梗一錢，五靈脂二錢，共爲末。每服五分，生薑泡湯調下。

倪朱謨曰局方諸風痰藥中往往用此以祛風行痰順氣活血於卒中痰風鬱閉不通者極靈

龍腦香。味辛苦。氣寒。性熱。無毒。陽中之陽。升也。散也。

李氏曰：龍腦香俗呼為冰片，又名梅花腦，因其白瑩如冰及梅花片狀，故名。出婆律、林羅、短叱諸國，今南海深山窮谷亦有之。其液為膏，其脂為香。蘇氏曰：其樹高六七丈，大四五圍，形如老杉木狀，其皮亦如杉木，氣芳，生勁枝，葉圓而青，背白，作花結實，如荳蔻仁，皮有甲錯。蘇氏曰：其木肥者，根下有清液，為婆律膏，隨其樹液流根下，截其上，液溶木端，其皮稍未經損動則有香，香則氣洩無之矣。無花實者，其木瘦，瘦者生香，為龍腦香，多歷年歲者，風清月朗時，噴香氣，明若霏雲繽紛，木上先其時布帛纏樹底，驚之，令隨形如蜂蝶翅，此翳上品，頃則仍毀香入木理，不易得也。又蘇氏曰：斷其樹，蒸時無香，乾之衡理而析，狀類雲母，瑩若冰雪，或解木作版，香溢縫鬪勝而取之，大者成片如花瓣，小者成粒，為米腦，為瑞腦，為金腳腦，為蒼龍腦，因其形色為名，總不及如蜂蝶成片者，氣全力精也。熬者為腦油，清者為腦漿，異聞錄云：南唐保大中貢龍腦漿，附之縑囊，懸琉璃瓶內，少頃滴瀝成水，香氣清烈，為世所珍也。寇氏曰：近時多用火煏成片，更以樟腦升打偽造，不可不辨。收時燒杉木炭合養之，或糯米炭共貯之，則不耗。修治：入得瓷鉢輾展，徐研，務令塵細，急展則粘鉢生熱，便隨香竄耗，欲藉透

脫走竅，用平底小鐺，以青布剪如底式，一面噴濕淨水，粘貼鐺底，置龍腦于布上，覆以盌，盌沿外餘布數分，水攪麥麵固濟盌布周沿，勿使氣洩，將鐺底寸許燃燒文火，候麥麵色熟，略覺焦黃，即便住火，候冷開視，火法合宜，龍腦盡昇盌上，輕鬆潔白，香復百倍于昔。○李氏曰：又按宋史熙寧九年，英洲雷震，深山中一梓樹，木盡枝中皆化爲龍腦香，此雖屬怪異，可見龍腦亦由變化而成者也。

○龍腦香，開竅日華辟邪之藥也。性善走竄，啓發壅閉，開達諸竅，無往不通。然芳香之氣，能辟一切邪惡；辛烈之性，能散一切風熱。故唐本草主暴赤時眼，腫痛羞明，或喉痺癰脹，水漿不通，或腦風頭痛，鼻瘜鼻淵，或外痔腫痛，血水淋漓，或交骨不分，胎產難下，或風毒入骨，麻痛拘攣，或瘟毒內閉，煩悶不出，此藥辛香芳烈，善散善通，爲効極捷。一切卒暴氣閉，痰結神昏之病，非此不能治也。然

非常服之藥，如大人小兒風涎閉塞及暴得驚熱者可用，如久病元虛而成中風風痺之證，吐瀉後成慢驚者不可用也。眼目係暴熱成翳障者可用，如肝腎精血不足成昏暗者不可用也。風痛在骨髓者可用，在血脈肌肉者不可用也。世但知其凉而通利，未達其熱而輕浮飛越，喜其香而貴重，動輒與麝香同爲桂附之助。然人身之陽易動，陰易虧，不可不慎也。

潘壽軒先生曰：一女子年十歲，病發熱腰痛，手足厥逆，評言譫妄，神氣昏迷，形證極惡。一醫云陽毒傷寒，一醫云陰證傷寒。予診其脈，沉緊而數，詢其家人云尚未出痘，予疑是痘候。時暑月，急取屠家猪心血半盞，用冰片

二分。研細。和服。得睡。須臾。一身痘出而安。若非此方。則橫天矣。又昔廖瑩中。以熱酒服一握。九竅流血而死。此非冰片有毒。乃熱酒引其辛香。散溢經絡。氣血沸亂而然爾。

○集方、治暴赤時眼。用冰片、五分。硼砂、一錢。薄荷、二錢。共爲極細末。頻嗜兩鼻。○治喉痺痰癰。服用冰片、二分。燈心、三錢。黃栢、二錢。二味燒存性。白礬七分。煅。共爲極細末。每以一二分。吹患處絕妙。○治頭風頭痛。用冰片、五分。天南星、五錢。共爲極細末。薑汁調敷痛處。○治鼻生瘜肉。垂出脹塞不通。用冰片、一味。點之自消。病頭風腦漏之人。多患此。○治外痔脹疼。用冰片、三分。嫩滑石、三錢。

共爲極細末不時摻之○治産難催生用冰片三釐溫湯調服立産○治風毒入骨將成廢人用冰片一錢天南星生半夏各五錢鳳仙花子三錢共研極細末葱汁調塗痛處如乾落再以葱汁調濕塗之○治痘毒內閉不出狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透者用冰片一錢細研旋以猪心血丸芡實子大每服一丸紫草煎湯調下少頃心神便定得睡瘡發○治中風牙噤無門下藥用冰片三分天南星二錢共爲極細末每以三分揩齒二三十遍其口自開○治下疳臭爛用冰片五分嫩蘆甘石四錢共研極細末不時摻之○求死不得用冰片三錢熱湯吞下氣散立死

○陸醫禁方抄孝宗太后患眼疾瘇痛赤癢晝夜不寐不肯服藥。不肯點藥，一醫奏取大冰片一兩鋪盤內請太后細細觀之，少頃瘇痛潛消。赤癢頓退。蓋取冰片之氣，追眼清香涼而散之，故目之瘇痛赤癢自退矣。亦巧法也。

牛黃膏濟病百科治婦人熱入血室。發狂不認人者用冰片二分。牛黃三分，甘草一錢，硃砂、鬱金、牡丹皮各三錢，共為極細末，煉蜜丸。如皂角大，每服一丸，燈心湯化下。此方兼可治男婦癲狂風癇諸證。

紫鉚味甘鹹氣平有小毒

按酉陽雜俎云紫鉚樹出眞臘國及波斯國土人乎為渴廩又名勒佉樹高一丈枝葉繁盛宛如橘柚木與滋液俱赤色經冬不凋四月開花白色不結實天有霧露及雨花濡潤則枝條出鉚狀如糖霜累累紫赤破則鮮紅用造臙脂枝作宮女面飾與騏驎竭相類實非一種也

〇紫鉚起痘行漿之藥也唐本草治痘不作漿或皮薄欲損血溢于外者用之取其象形以從治也

王紹隆先生曰男女媾精姪欲之毒遂含胞胎伏藏兩腎有生之後發為痘瘡始發也如春氣之升行漿也如夏氣之出回合也如秋氣之降剝落也如冬氣之入舉世但知始發之欲透末知毒化之成漿猶為切要何也如去滓純水必清必靜全賴此耳否則仍含毒種復歸

兩腎生死存亡，變生不測矣。紫鉚固爲解毒之要品，但可施于化毒之際，不可施于始發之期。更有毒未化而漿不行，反棄鉚液之横偏，頂投保元之降藏，雖不顧姪毒之不攘，獨不念六淫之未散乎？司業者當留心而熟思之可也。

○集方：治痘瘡皮破，漿水泛出，或手搔傷損，用紫鉚研極細末，敷之即乾斂，不走洩元氣。龐氏○治痘瘡漿不豐滿，或乾枯，或水塌不透者，用紫鉚一二分，爲細末，糯米湯調灌，或人參湯調，或純酒漿調，亦可。同前

樟腦味辛氣熱無毒

李氏曰樟腦出漳州韶州狀如龍腦白色如粉潮乃樟樹脂膏也又胡氏煉樟腦方云用樟木新鮮者切片以井水浸三日入鍋煎之柳木頻攪待汁減半柳木上有白霜泄即濾去滓傾汁入瓦盆內經宿自然結成塊也他處雖有樟木不能取腦又陳氏方昇煉樟腦一法用銅盆一只以陳壁土為粉細末摻盆底次摻樟腦一重又摻壁土一重如此四五重以薄荷葉放土面上再用銅盆一只覆之用細黃土鹽滷捧水和如膏封固勿令走氣于文火上款款炙之須以意度不可太過不可不及候冷取出則腦皆昇于上盆如此昇兩三次潔白如雪可僞充片腦也

○樟腦通竅殺蟲除疥癬瘡瘍之藥也李氏方云此藥辛熱香竄稟龍火之氣去濕殺蟲此其所長故燒烟熏衣滅虱逐蚤薰房室并牀帳枕簟善辟臭蟲及一切蟻蜉蠅螫等類又集要方治腳氣止牙疼總之去濕殺蟲盡

在是矣。此雖收塗，不堪服食。故外科方每需用耳。

○集方：治一切瘡瘍蟲疥，及一切頑癬有蟲者。用樟腦二兩，大楓子肉二兩，搗膏，大黃、硫黃、胡椒各五錢，三味俱微炒，為細末，和入大楓膏內，再入樟腦同搗勻，再入水銀五錢，再研勻，再搗三百下，為丸彈子大，每臨臥時，被內以單被捫身擦之，不過二三次愈。如治頑癬，本方再加斑猫末五分，信石末一分，如難乾燥，諒加香油些須亦可。○治小兒禿瘡，用樟腦三錢，花椒末、瀝青末各二錢，生芝麻一兩，先以退豬湯洗淨患上，以香油少許調搽。

○治蟲牙疼痛，用樟腦、黃丹各一錢，切做五分，共研細，煉蜜丸，如黍米大，塞患孔中。○治腳氣腫痛，用樟腦三錢，草烏頭二錢，為極細末，醋糊丸，彈子大，每置一丸于足心，踏之，下微火烘之，衣被圍覆，汗出如涎，即效。

阿魏味辛。氣平。無毒。

蘇氏曰。阿魏生西番。及崑崙國。苗葉、根莖酷似白芷。搗根汁。煎成為上。截根聯乾為次。珣氏又言。阿魏生崑崙國。是木津液。如桃膠狀。其色黃者為上。色黑者次之。陳氏又言。阿魏雲南長河中亦有。今廣州亦有。是木膏液。錆之汁出。漸滴凝結。與蘇氏所說不同。又酉陽雜俎云。阿魏出波斯國及北天竺。其樹長八九尺。其色青黃。三月生葉。似鼠耳。無花實。其枝汁出如水。久乃堅凝。又言取其汁。和米豆屑合釀而成。諸說雖不同。而氣體極臭。而又能止臭。亦為奇物也。戎人則皆炎謂能止臭猶閒廣嘗擷舉中州。貴胡收巴人重負異也。又元紀云。阿魏元人用充食料。根名穩展。又名蹟槳。用淹牛羊肉。轉更香美。器若亦不色變。○李瀕湖曰。阿魏有草木二種。草者出西域。可煎可曬。蘇氏所說是也。木者出南番。取其脂汁凝結。隨氏陳氏所說是也。又按一統志所載有此二種。云出火州及沙鹿海牙諸國。草高尺許。根株獨立。枝葉如蓋。臭氣逼人。生取其汁熬膏。名阿魏。又言出三佛齊及暹羅國。樹不甚高。土人納竹筒于樹內。脂滿其中。冬月破筒取之。又云其樹枝高。其脂最毒。其氣逼人。最臭不敢近。每采時。以羊繫于樹下。自遠射之。脂液着羊。羊斃。即為阿魏。觀此則其有二種明矣。然繫羊射脂

之說偽評相傳但無實據修治以熱酒溶化和入藥用

倦云阿魏無眞言多偽也今市家攙蒜肉雜以他物偽充不可不辨雷氏曰驗阿魏眞假有三法一法以半銖安熟銅器中一晝夜著處色白如銀永不變色二法以一銖置五斗草自然汁內次早盡變鮮紅色三法以一銖置楠柚樹上其樹立乾驗此三法眞偽判然矣

○阿魏化積墮胎殺蟲療蠱之藥也其氣辛烈而臭元人入食料中能辟一切肉食鱉魚腥葷諸毒凡水菓蔬菜米麥穀豆之類停留成積者服此立消故汪氏方治瘴癘瘟疫霍亂瘧痢尸蟲痞結等候咸取其氣息極辛極臭之物以除此不正之氣以致疾耳氣味雖有穢惡然不大損胃氣故方脉科多需用而不棄也

繆仲淳先生曰捄人血氣聞香則順聞臭則逆雖有痞積不可輕用當先養胃氣胃強則堅積漸消矣書曰大

積大聚其可犯也衰其半而止諸病疏下根本者乎。

○集方治一切痞塊癥瘕食飲血氣成積者用阿魏五錢白芥子四兩白朮三兩三稜莪朮各二兩四味俱炒燥研爲細末以阿魏熱酒溶化和入爲丸黍米大每早晚各服二錢白湯下婦人病此本方加當歸川芎乾漆俱酒炒各一兩○又貼痞膏用阿魏乳香沒藥芒硝各二兩俱研細聽用外用大黃二兩白芥子三兩木鼈子二十一箇去殼穿山甲肉桂川獨活各一兩五錢亂髮二兩用香油四十兩煎黑去楂待油冷凝入鍋內乘油冷時加水飛淨細炒燥黃丹二十兩將油煎滾用鐵箸不住手攪以黃丹畧熱軟硬得所提起將凝加入阿魏乳

沒硝四味細末在內。攪勻，即成膏矣。凡貼膏藥時，先用芒硝、研細。隨患處鋪半指厚，以紙蓋定，用熱熨斗熨良久。如硝耗再加熨之。三時許，方貼膏藥。○治尸疰中惡近死尸，惡氣入腹，終年嘗發者，用阿魏二分，侵晨熱酒吞下。并治瘟疫痞癖霍亂痃瘧諸病。○治小兒腹脹內痞、腹痛不止，用眞阿魏一錢為末，大蒜一個煨熟研爛，和丸如麻子大，每服五丸，艾湯化下。○治脾積結塊，用阿魏五分，雞子五箇，去殼，湯內同阿魏煮，以湯乾雞子黃白俱老，入石臼內同搗勻細，黃蠟一兩溶化，入阿魏雞子膏同熬數十沸，入香油五六茶匙，攪勻，再入石臼內搗百下，為丸如黍米大，每服一錢，白湯下。

蘆薈味苦氣寒無　沉也降也入心肝脾三經

李氏曰蘆薈出波斯國及瓜哇三佛齊諸國今廣州亦有之生深山中乃樹脂滴凝而成狀如黑錫又一說云狀似鱉尾乃草屬也采取無時蘇氏曰蘆薈原在草部今移入木部二說不同何哉豈是木質而草形抑木形而草質者乎

○蘆薈涼肝殺蟲之藥也宋開寶方主除心肺熱煩去胸膈鬱火大人疳瘦濕癬小兒疳積蟲痔癲癇驚痰諸疾又去三蟲消五臟凡屬肝臟為病有熱者用之必無疑也但味極苦氣極寒諸苦寒藥無出其右者其功力主消不主補以上數證因內熱氣強者可用如內虛泄瀉食少者禁之

李瀕湖先生曰蘆薈乃厥陰經藥其功專于殺蟲清熱

故治熱痢成積有效。

蘆不遠先生曰：蘆薈傳說有草木二種，以國異其形別，亦有之味極苦，氣極寒。對治以熱為因，為疳為癖為熱聚所生之蟲癖，莫不將良。

○集方：治疳瘦脹痛，面木消瘦，用蘆薈數分，白酒磨化，和米飲二三匙調服。○治濕疳發癢，延蔓成癬，或在頭項，或在手足，或在腰胯，用蘆薈五錢，甘草二錢，共研末，先以溫米泔水洗癬，拭搽數之，並乾，便搽。○治小兒疳積蟲積，用蘆薈三錢，使君子肉一兩，共研末，每服三分，白湯調下。○治大人小兒五種癲癇，用蘆薈三錢，生半夏一兩，切碎，鹽汁拌炒，白术一兩，酒炒，甘草五錢，炒，共為細末，水發為丸，如黍米大，每服一錢五分，鹽湯送下。○治小兒急驚風，用蘆薈、膽星、天竺黃、雄黃各一錢，共為末，甘草湯和丸，如彈子大，每遇此證，用燈心湯化服一丸。○治蛔結心痛，用蘆薈一錢，剪碎如米粒大，用烏梅花椒湯吞服。○治五種膨脹，用蘆薈、蟾酥各三錢，消蕊浸一日，蒸化如膏，以生半夏為末二兩，巴霜三分，和丸如黍米大，每服十丸，淡鹽湯早晚吞下，忌鹽醬百日。

孩兒茶味苦澁氣平無毒

李氏曰孩兒茶出南番瓜哇暹羅諸國今雲南老撾暮雲場地方造之云是細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汚泥溝中日久取出搗汁熬製而成其塊小而潤澤者爲上塊大而焦枯者次之

○孩兒茶解山嵐瘴熱斂瘡生肌之藥也張相如曰服食方鮮有用者惟入外科收斂瘡口摻藥中用此能定痛止血收濕生肌又兒科牙疳方中配川黃連共爲細末摻牙根處亦能斂潰收濕定痛生肌出李氏綱目今吳門市中售香茶以孩兒茶爲主食之果香甘涼烈移時藥味已過轉增燥渴次飲更覺口乾苦濇較前倍常則前人所云解渴生津未可深信